



Żelazo nowej generacji

Opakowanie	Cena
30 kapsułek	24.00 zł

OPIS

ŻELAZO NOWEJ GENERACJI

Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne



Chela-Ferr® MED to preparat zawierający żelazo Ferrochel® w postaci chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian żelaza) wysoko przyswajalną i dobrze tolerowaną postać żelaza.

Żelazo zawarte w preparacie Chela-Ferr® MED to:

- najwyższa biodostępność w odróżnieniu od innych form żelaza
- bezpieczne działanie
- chelat aminokwasowy o strukturze potwierdzonej naukowo opatentowaną metodą FT-IR TRAACS®
- lepsza tolerancja oraz redukcja efektów ubocznych
- brak interakcji z witaminami i minerałami, co potwierdzono w wieloletnich badaniach naukowych


Ponadto żelazo Ferrochel® posiada:

certyfi kat GRAS (ang. Powszechnie Uznany za Bezpieczny) przyznany przez FDA
pozytywną opinię EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności)

Chelat aminokwasowy żelaza Albion® jest całkowicie hipoalergiczny (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu.

Jak działa Chela-Ferr® MED?

W swojej zwykłej postaci związki mineralne są trudno wchłaniane w jelitach z powodu swojego ładunku i ograniczonej powierzchni wchłaniania jelitowego, pH, obecności innych składników w jelitach i dostępności innych czynników absorpcyjnych. Organizm łatwiej wchłania małe peptydy białkowe. Nieorganiczne składniki mineralne mogą wiązać się z aminokwasami w organizmie, wykorzystując powinowactwo jelit do wchłaniania białek. Właściwość ta została zastosowana w Chela-Ferr® MED. Żelazo zawarte w tym preparacie występuje w formie związanej z aminokwasem, wskutek czego powstaje identyczny z naturalnym kompleks chelatowy, który może z łatwością przechodzić przez ścianę jelit.



INNY PREPARAT (Z SIARCZANEM ŻELAZA)

Absorpcja żelaza z siarczanu. Poniżej kosmków widać żelazo nieprzyswojone i jedynie **niewielką ilość zaabsorbowanego żelaza** na kosmkach (na czerwono).

CHELA-FERR™ MED

OBSZARY NA CZERWONO WSKAZUJĄ NA WYSOKĄ ABSORPCJĘ ŻELAZA DO KOSMKÓW JELITOWYCH.

Źródło: Ashmead HD, et al, *Intestinal Absorption of Metallon sand Chelates*, (Springfield Charles C. Thomas)1985

Właściwą absorpcję żelaza z przewodu pokarmowego oraz ściśle kontrolowaną dystrybucję w obrębie organizmu zapewniają utworzone chelaty aminokwasowe tego pierwiastka, charakteryzujące się niezwykle najwyższą biodostępnością i całkowitym bezpieczeństwem stosowania.



› SKŁAD

Wartość odżywcza	1 kapsułka	100 g
Wartość energetyczna	1,4 kcal / 5,8 kJ	347 kcal / 1452 kJ

Białko	0,2 g	42,5 g
Węglowodany	0,2 g	45 g
Tłuszcz	0 g	0,01 g
Żelazo	30 mg (214%*)	7,5 g

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: diglicynian żelazawy (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel® TRAACS®), maltodekstryna, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna - składnik otoczki, barwnik: dwutlenek tytanu).

› PRZEZNACZENIE

Preparat przeznaczony: do postępowania dietetycznego ze wskazaniami lekarskimi dotyczącymi stosowania w stanach:

- **zwiększonego zapotrzebowania na żelazo:** (np. okres ciąży, obfite krwawienia menstruacyjne, krwiodawstwo, intensywne uprawianie sportów, u dzieci i młodzieży w okresach intensywnego wzrostu),
- **zmniejszonego wchłaniania żelaza** (które może wystąpić między innymi w celiakii, przewlekłym zapaleniu trzustki),
- **niedokrwistości** z niedoboru żelaza
- **niedoboru żelaza** spowodowanego nieprawidłowym żywieniem, stosowaniem niezbilansowanych diet wegetariańskich, w tym diety makrobiotycznej, diet odchudzających,
- **chemioterapii** i okresie **okołooperacyjnym**
- **w przypadku syndromu zmęczonych nóg** (RLS)

› DAWKOWANIE

Sposób użycia i przygotowania: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego może być stosowany jako źródło żelaza w niedoborach żelaza i/lub anemii dla dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży i osób dorosłych w dawce 1 kapsułkę dziennie. W szczególnych przypadkach lekarz może zalecić inny sposób dawkowania. Preparat należy przyjąć po posiłku połykając kapsułkę i popijając dużą ilością wody. Zawartość kapsułki można dodać do posiłku lub rozpuścić w soku.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.